



Klinika Położnictwa, Chorób Kobietych i Ginekologii Onkologicznej

Informacja dla pacjentki oraz formularz świadomej zgody na
PODANIE OKSYTOCYNY CELEM INDUKCJI/STYMULACJI PORODU
LUB WYKONANIE TESTU OKSYTOCYNOWEGO

Imię i nazwisko:

PESEL/ Data urodzenia:

Nr ks. gł.:

Zostałam wyczerpująco poinformowana o:

1. Ogólnym stanie zdrowia, rozpoznaniu:

.....
.....

2. Rodzaju, sposobie przeprowadzenia zabiegu:

Oksytocyna jest hormonem tylnego płata przysadki mózgowej. Powoduje skurcze mięśni gładkich przez zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapniowych. Działa na specyficzne receptory na komórkach mięśniowych macicy, których liczba zwiększa się w ciąży osiągając maksimum przed terminem porodu. Oksytocynę podaje się w wlewie dożylnym.

3. Celu, oczekiwanych korzyściach przeprowadzenia zabiegu, rokowaniach:

Oksytocynę podaje się w celu indukcji porodu, stymulacji porodu, teście oksytocynowym. Ponadto oksytocynę stosuje się po urodzeniu płodu celem wydalenia popłodu, ułatwienia kurczenia się macicy po porodzie i kontroli krwawienia poporodowego. Oksytocyna po porodzie zapobiega także niedowładowi macicy.

4. Sposobie postępowania przed/ po wykonaniu zabiegu:

W trakcie indukcji stymulacji porodu oksytocyna podawana jest we wlewie dożylnym. Przed porodem pacjentka jest badana położniczo. W trakcie wlewu z oksytocyną pacjentka pozostaje podłączona do zapisu KTG. Prędkość wlewu dostosowuje się do aktualnej czynności skurczowej macicy tak, aby uzyskać normotoniczną czynność skurczową macicy. W przypadku testu oksytocynowego podaje się 1 j.m. Oksytocyny we wlewie kroplowym aby uzyskać czynność skurczową macicy pod kontrolą zapisu KTG. Ma to na celu diagnostykę niewydolności maczyno-łożyskowo- płodowej i determinuje dalsze postępowanie terapeutyczne.

5. Możliwych, najprawdopodobniejszych następstwach, zagrożeniach powikłaniach związanych z zabiegiem:

Do możliwych działań niepożądanych u matki należą skurcz tężcowy macicy, pęknięcie macicy, reakcja nadwrażliwości, zaburzenia rytmu serca, wahania ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty, zatrucie wodne. Powikłania u płodu: zaburzenia czynności serca u płodu, ostre wewnątrzmaciczne niedotlenienie płodu, krwawienia do siatkówki, niższe wartości punktowe w skali Apgar.

6. Konsekwencjach zaniechania leczenia:

W przypadku zaniechania podania oksytocyny w zależności od sytuacji klinicznej może wystąpić przenoszenie ciąży, wewnątrzmaciczne niedotlenienie płodu, wzmożony krwotok poporodowy, niedowład macicy, niedostateczna czynność skurczowa macicy, przedłużający się poród.

7. Alternatywnych metodach leczenia:

Po urodzeniu płodu alternatywą w zapobieganiu krwawienia i niedowład macicy jest zastosowanie: prostaglandyn-mizoprostol; karbecotyny; metherginy.

8. Przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu:

Nadwrażliwość na oksytocynę, poprzeczne lub skośne położenie płodu, łożysko przodujące lub nisko schodzące, zagrażające pęknięcie macicy, zaburzenia sercowo naczyniowe u pacjentki, wypadnięcie pępowiny.

9. OŚWIADCZENIE PACJENTKI

Oświadczam, że podczas wywiadu lekarskiego i badania nie zataiłam/nie zataiłem istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia, badań oraz przebytych chorób. W pełni zrozumiałam informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy z lekarzem. Zapewniono mi nieograniczone możliwości zadania pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi i wyjaśnień w sposób satysfakcjonujący.

Po zapoznaniu się z treścią tego formularza i rozmowie wyjaśniającej z Panem/Panią Dr.....spełnione zostały wszelkie moje wymagania co do informacji na temat:

-rozpoznania

-proponowanych oraz alternatywnych metod diagnostycznych i leczniczych

-dających się przewidzieć następstw zastosowania tych metod lub ich zaniechania

-wyników leczenia

-rokowania

-ewentualnego dalszego leczenia

Znane mi są możliwe powikłania związane z tym zabiegiem.

Bez zastrzeżeń (lub z powyższymi zastrzeżeniami) zgadzam się na:

PODANIE OKSYTOCYNY CELEM INDUKCJI/STYMULACJI PORODU LUB WYKONANIA
TESTU OKSYTOCYNOWEGO

.....

data

podpis lekarza

podpis pacjentki albo uprawnionego opiekuna

Nie zgadzam się na zaproponowane mi postępowanie. Zostałam
poinformowana o możliwych negatywnych konsekwencjach takiej
decyzji dla mojego zdrowia i życia.

.....

data

podpis lekarza

podpis pacjentki albo uprawnionego opiekuna

Podpisanie formularza przez pacjentkę jest niemożliwe z powodu

.....