


Przygotowanie pacjenta do badania mikrobiologicznego



Zasady ogólne

- Zawsze stosuj się do zaleceń lekarza, pielęgniarki lub pracownika laboratorium dotyczących konkretnego badania.
- Poinformuj lekarza o przyjmowanych lekach, zwłaszcza antybiotykach oraz lekach stosowanych miejscowo (maści, globulki, płukanki itp.)
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, materiał najlepiej pobrać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub tuż przed kolejną dawką leku.
- Do pobrania materiału użyj wyłącznie jałowego pojemnika otrzymanego w laboratorium, aptece lub na oddziale.
- Po pobraniu materiału szczelnie zamknij pojemnik, opisz (imię, nazwisko, data, godzina) i dostarcz do laboratorium możliwie jak najszybciej, najlepiej w ciągu 2 godzin. W przypadku, gdy jesteś pacjentem oddziału - przekaz personelowi.



Mocz – posiew

- Przed pobraniem dokładnie umyj ręce i okolice ujścia cewki moczowej (kobiety: od przodu do tyłu, mężczyźni: z odsłonięciem napletka).
- Pobierz środkowy strumień moczu (pierwszą porcję oddaj do toalety, bez przerywania strumienia podstaw pojemnik i pobierz materiał).
- Dostarcz mocz do laboratorium możliwie jak najszybciej, najlepiej w ciągu 2 godzin (w razie konieczności przechowuj w lodówce).

Wymazy z gardła, nosa, jamy ustnej

- Na 2–3 godziny przed badaniem nie jedz, nie pij, nie żuj gumy, nie myj zębów, ani nie stosuj płukanek lub sprayów odkażających do jamy ustnej i gardła (chyba że lekarz zaleci inaczej).
- Na badanie zgłoś się na czczo lub po upływie wskazanego przez laboratorium czasu od ostatniego posiłku.



Plwocina

- Plwocinę pobierz na czczo, najlepiej rano
- Umyj zęby, wyjmij protezę zębową jeśli posiadasz
- Przeplucz jamę ustną przegotowaną wodą
- Wykrztuś wydzielinę bezpośrednio do jałowego pojemnika

Posiew z ran, skóry, miejsc intymnych

- W dniu badania nie stosuj na miejsce pobrania maści przeciwbakteryjnych, kremów, zasypek ani środków odkażających (chyba że lekarz zaleci inaczej).
- Zewnętrzną higienę wykonaj zgodnie z codzienną praktyką, unikając silnych środków odkażających bezpośrednio przed pobraniem.
- W przypadku wymazów z miejsc intymnych - unikaj współżycia przez okres 24-48h.

Krew na posiew

- Dotyczy pacjentów szpitalnych.
- Do pobrania krwi na posiew nie jest wymagane specjalne przygotowanie (nie musisz być na czczo, chyba że lekarz zaleci inaczej).
- Poinformuj personel o przyjmowanych lekach oraz o wcześniejszych omdleniach przy pobieraniu krwi.



Kał – badanie bakteriologiczne

- Kał pobierz do specjalnego, czystego pojemnika (najlepiej otrzymanego w laboratorium, aptece lub na oddziale), unikając domieszki moczu lub wody z toalety.
- Pobierz niewielką ilość kału (porcja wielkości orzecha włoskiego), najlepiej z domieszką śluzu, ropy lub krwi.